


Що робити, якщо в дитини, яка відвідує заклад освіти, виявили кір?



Пам'ятка для керівників
та медичних працівників
освітніх закладів

Шановні освітяни!

В Україні високий ризик виникнення **спалаху кору** — **небезпечної інфекції**, яка загрожує усім без імунітету до неї. Найкращий спосіб набути імунітет до кору — **вакцинація**.

Кір надзвичайно заразний і дуже легко передається від людини до людини, швидко поширюється в школах та дитсадочках, якщо не всі діти та співробітники мають необхідні щеплення. **З 10 невакцинованих людей, які проконтактували з хворим, 9 інфікуються.**

Нижче ви знайдете поради, як діяти, якщо в когось із дітей чи співробітників з'являться симптоми кору. Будь ласка, поділіться цією інформацією з колегами та батьками!

Симптоми кору

Першими ознаками хвороби є:

- гарячка;
- головний біль;
- кашель;
- збільшені лімфовузли;
- почервоніння та запалення очей, сльозоточивість та світлочутливість;
- можливі пронос та блювота.
- **На 2-3 день** хвороби в роті на слизовій щік можуть з'явитися дрібні білуваті плями.
- **На 4-5 день** хвороби починається червоне висипання на голові, що поступово поширюється на тулуб та кінцівки.

Що робити батькам, якщо в дитини з'явилися симптоми кору

Потрібно повідомити своєму **сімейному лікарю/педіатру (зателефонувати або написати)** та розповісти про симптоми.

Важливо! Уникайте контактів з іншими людьми, щоб нікого не інфікувати. З цієї причини не можна йти на загальний прийом. Для прийому осіб з підозрою на кір чи інше високозаразне небезпечне захворювання медзаклад має спеціальні алгоритми — окремий вхід чи окремі години прийому, наприклад.

Що робить лікар, якщо до нього привели дитину із симптомами кору

- Оглядає дитину, ставить діагноз та призначає лікування.
- Одночасно повідомляє про цей випадок в регіональний Центр контролю та профілактики хвороб.
- Якщо дитина ходить до школи, дитсадочка, відвідує спортивні чи інші гуртки, то Центр контролю та профілактики хвороб повідомляє про можливий випадок кору керівництву цих закладів.

Що робити медичному працівнику освітнього закладу, в якому зареєстровано можливий випадок кору

1. **Повідомити** про це співробітників закладу та батьків дітей.
2. Перевірити **вакцинальний статус** усіх дітей, які навчаються в освітньому закладі, а також співробітників закладу освіти, які могли бути в контакті з цією дитиною.
3. Рекомендувати **протягом 3 днів вакцинувати проти кору дітей**, які не були щеплені або мають лише одну дозу вакцини. Вакцинація може бути проведена в закладі освіти. Для цього можна запросити мобільну бригаду з вакцинації. В іншому разі дітей можна направити на щеплення до сімейного лікаря/педіатра.
4. У край рідкісних випадках, якщо у контактної дитини раніше була **анафілактична реакція** на попередню дозу вакцини КПК чи контактна дитина має **імунодефіцит або проходить терапію**, яка пригнічує імунітет, й тому має протипоказання до вакцинації проти кору – замість вакцини такої дитині вводять **імуноглобулін протягом 6 днів після контакту**.
5. Усіх **контактних дорослих, які не мають щеплень** від кору або мають лише 1 щеплення і які не хворіли на кір, протягом трьох днів направити до сімейного лікаря, де вони мають отримати **екстрене щеплення** від кору.
6. **Вагітним**, які контактували з хворим на кір, необхідно рекомендувати звернутися до сімейного лікаря.
7. Усі вакциновані діти та дорослі можуть і далі відвідувати освітній заклад **без необхідності ізоляції**.
8. Потрібно протягом **21 дня** з моменту виявлення хворого на кір в освітньому закладі **спостерігати** за визначеними контактними особами, чи не з'являться в них симптоми кору.
9. **Нещеплені діти**, батьки яких відмовляються від вакцинації, не можуть відвідувати освітній заклад, поки підтверджують діагноз хворій дитині, а якщо кір підтвердиться, то відвідувати заклад їм заборонено протягом 21 дня після виявлення останнього випадку захворювання.
10. Допуск до навчального закладу дітей, які захворіли на кір, здійснюється лише після **їхнього повного видужання** та за наявності відповідної медичної довідки.

Пам'ятайте: специфічних ліків проти кору немає.

Єдиним надійним захистом від хвороби є вчасна вакцинація!

Коли потрібно робити щеплення від кору

1 рік

Перша доза
щеплення КПК

6 років

Друга доза
щеплення КПК

Якщо щеплення не зробили вчасно, його потрібно наздогнати якнайшвидше.

Цілодобовий контакт-центр МОЗ

0 800 60 20 19

Оператори дають відповіді на питання зі сфери охорони здоров'я.

Є питання щодо вакцинації?

0 800 35 18 96

Телефонуйте на гарячу лінію МОЗ та ЮНІСЕФ «Спільно до здоров'я»*.

*Проект співфінансується Європейським Союзом та Федеральним урядом Німеччини через Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH у партнерстві з ЮНІСЕФ та МОЗ України.